

Leitliniengerechtes Vorgehen bei der Krätze (Skabies) 2016

Erkrankung eines Erwachsenen	Erkrankung eines Kindes	Erkrankung einer Schwangeren	Erkrankung einer Stillenden
<p>1. Wahl : (äußerlich)</p> <p><u>Permethrin 5%</u></p> <p>Ganzen Körper einreiben und nach 12 Stunden abduschen. Einreiben vom Unterkiefer bis Fußsohle, ggf. auch hinter dem Ohr.</p> <p>In Heimen/Unterkünften für Flüchtlinge in 1 Woche die Therapie noch einmal wiederholen (Compliance).</p>	<p>Säuglinge sollten nur örtlich (topisch) im Krankenhaus behandelt werden.</p> <p>< 3 Jahre alte Kinder nur topisch behandeln. Kopfhaut muß mit behandelt werden [Permethrin 5 %]</p> <p>> 3 Jahre alte Kinder 1. Wahl: Permethrin 5%. 2. Wahl Benzylbenzoat 10 % [niedriger dosiert als beim Erwachsenen]</p>	<p>Aufklärung über fehlende Zulassung!</p> <p>1. Wahl: Permethrin 5 %</p> <p>2. Wahl: Benzylbenzoat Antiscabiosum 25 %[®]</p> <p>3. Wahl: Crotamiton Crotamitex[®] Gel</p> <p>Invermectin (Stromectol[€]) ist in der Schwangerschaft kontraindiziert.</p>	<p>1. Wahl Permethrin 5 %</p> <p>dabei muß die Stillende entweder abstillen oder eine 5 tägige Still-Pause einlegen. Die Muttermilch muß dabei verworfen werden.</p>
<p>2. Wahl : (oral)</p> <p>Ivermectin (Stromectol[®])</p> <p>Körpergewicht 50 – 60 kg 3 Tabletten Stromectol 3mg</p> <p>Körpergewicht 60 – 70 kg 4 Tabletten Stromectol 3mg</p> <p>Körpergewicht 70 – 80 kg 5 Tabletten Stromectol 3mg</p> <p>Körpergewicht über 80 kg 6 Tabletten Stromectol 3mg</p> <p>2 h vor und nach der Einnahme nichts essen!</p>	<p>Kinder über 15 kg schwer: 1. Wahl: Permethrin 5 % 2. Wahl: Ivermectin = Stromectol 3 mg an 3 Tagen</p>	<p>ergänzend zu allen Therapien sind die Hygienemaßnahmen zu beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isolation für 1 Woche 2. Auskochen der Bettwäsche aller Betten im Isolationszimmer 3. Kontrolluntersuchungen durch Arzt mindestens 1 x / Woche <p>ggf. müssen Therapien auch noch einmal wiederholt werden</p>	
	<p>STROMECTOL[®] 3 mg 30 Tbl.</p>	<p>PERMETHRIN[®] biomo Lösung 0,5%</p>	